Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Шуматов Валерий Борисович
Должность: Ректор
Дата подписания: 06.12.2023 09:54:49
Уникальный программный ключ:
1cef78fd73d75dc6ecf72fe1eb94fe3187a2985d2657b784eec019bf8a394bb4

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Тихоокеанский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации

«УТВЕРЖДАЮ»
Заведующий кафедрой
_____/Л. В. Устинова/
«20» июня 2023 г.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Дисциплины Б1.В.03 Фармацевтическое консультирование
основной образовательной программы высшего образования

Направление подготовки (специальность)	33.05.01 Фармация (код, наименование)
Уровень подготовки	специалитет (специалитет/магистратура)
Направленность подготовки	02 Здравоохранение
Сфера профессиональной деятельности	в сфере обращения лекарственных средств и других товаров аптечного ассортимента
Форма обучения	очная (очная, очно-заочная)
Срок освоения ООП	5 лет (нормативный срок обучения)
Институт/кафедра	фармации

Владивосток – 2023

1.1. Фонд оценочных средств регламентирует формы, содержание, виды оценочных средств для текущего контроля, промежуточной аттестации и итоговой (государственной итоговой) аттестации, критерии оценивания дифференцированно по каждому виду оценочных средств.

1.2. Фонд оценочных средств определяет уровень формирования у обучающихся установленных в ФГОС ВО и определенных в основной образовательной программе высшего образования по специальности 33.05.01 Фармация, направленности 02 Здравоохранение в сфере обращения лекарственных средств и других товаров аптечного ассортимента универсальных (УК) компетенций, общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных (ПК) компетенций

https://tgmu.ru/sveden/education/programs/farmaciya-v-sfere-obrascheniya-lekarstvennyh-sredstv-i-drugih-tovarov-aptechnogo-assortimenta_op0120.html

2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

2.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств

№ п/п	Виды контроля	Оценочные средства
		Форма
1	**Текущий контроль**	**Тесты**
		Ситуационные задачи
		Чек-лист
2	**Промежуточная аттестация**	**Вопросы для собеседования**

3. Содержание оценочных средств текущего контроля

Текущий контроль осуществляется преподавателем дисциплины при проведении занятий в форме: тестирования, ситуационных задач.

1. Жжение при мочеиспускании характерно для:
1. цистита
2. простатита
3. уретрита
4. пиелонефрита

Ответ: 3

2. Укажите наиболее частого инфекционного агента мочевых путей:
1. стафилококк
2. кишечная палочка
3. пневмококк
4. микобактерии

Ответ: 2

3. Препараты выбора лечения ИНМП у беременных:
1. фосфомицин

2. нитрофурантоин
3. фузидин
4. нитроксолин
Ответ: 1, 2
4. Альтернативная профилактика рецидивирующего цистита:
1. монурель
2. уро-ваксом
3. д-манноза
4. фруктоза
Ответ: 1, 2, 3
5. Назначаемая доза снотворного препарата пожилому человеку:
1. 2 таблетки на ночь
2. ½ дозы взрослого человека
3. 1 доза взрослого человека
4. 2 дозы взрослого человека
Ответ: 2
6. Послеродовую контрацепцию лактирующей женщине осуществляет:
1. мидия
2.силует
3. лактинет
4. жанин
Ответ: 3
7. Средства гормональной контрацепции обладают действием
1. подавления овуляции
2. сгущения цервикальной слизи
3. уничтожения сперматозоидов
4. снижения двигательной активности сперматозоидов
Ответ: 1, 2, 4
8. Дисбиоз влагалища восстанавливают с помощью:
1. раствором уксус
2. содового раствора
3. молочной кислоты
4. перекиси водорода
Ответ: 3
9. Немедикаментозные рекомендации родителям, дети которых больны гриппом:
1. соблюдение постельного режима
2. при гипертермии обтирать водой комнатной температуры
3. прогулки на свежем воздухе
4. с целью профилактики начать прием антибиотиков
Ответ: 1, 2
10 .Ребенку следует вызвать врача:
1. температура тела выше 40,0 0 С
2. пестрая, «мраморная» окраска кожи
3. на фоне жара, холодные на ощупь конечности
4. плаксивость
Ответ: 1, 2, 3
11. Препаратом 1-го выбора в качестве жаропонижающего средства является:
1. ибупрофен
2. парацетамол высокой очистки
3. ацетилсалициловая кислота
4. нимесулид
Ответ: 2
12. Снижение температуры тела следует начинать при :
1. t0 37,50С

2. t0 38,00С
3. t0 38,50С
4. t0 37,20С
Ответ: 3
13. Повторную дозу жаропонижающего препарата следует принимать:
1. регулярно с целью профилактики
2. только при повторном повышении t0 тела
3. до облегчения состояния
4. достаточно одного приема
Ответ: 2
14. Прием жаропонижающих средств целесообразно сочетать с приемом препаратов:
1. антибиотиков
2. от кашля
3. от насморка
4. от боли в горле
Ответ: 2, 3, 4
15. «Угрожающие» симптомы при респираторных заболеваниях, требующие обязательного направления пациентов к врачу:
1. повышение тела свыше 390С
2. сильная боль, одышка, судороги
3. гипертермия более 3 дней
4. жидкий стул
Ответ: 1, 2, 3
16. Наибольшую долю циркулирующих респираторных вирусов составляют:
1. аденовирусы
2. вирусы гриппа
3. риновирусы
4. вирусы парагриппа
Ответ: 3
17. Кашель, боль в горле, насморк появляются сразу в начале заболевания при:
1. гриппе
2. ОРВИ
3. ангине
4. ларингите
Ответ: 2
18. Покраснение глаз при наличии гипертермии-характерный признак:
1. гриппа
2. ОРВИ
3. парагриппа
4. бронхита
Ответ: 1
19. Показания к противовирусной терапии:
1. беременные
2. дети до 2-х лет
3. пожилые старше 65 лет
4. подростки
Ответ: 1, 2, 3
20. Противовирусные препараты прямого действия (с высокой доказательной базой):
1. умифеновир
2. имидазолилэтанамид пентадиовой кислоты
3. метглюмина акридонацетат
4. интерферон α
Ответ: 1, 2

21. Препарат с наибольшей эффективностью среди противовирусных ЛС опосредованного действия:

1. кагоцел
2.циклоферон
3. амиксин
4. пентальгин

Ответ: 3

22. Инозин пранобекс

1. иммуномодулятор
2. противовирусный
3. комбинированного действия
4. антисептик

Ответ: 3

23. Рекомендованная ВОЗ оптимальная дозировка ацетаминофена в комбинированных ЛП:

1.500 мг
2. 1000 мг
3. 325 мг
4. 350 мг

Ответ: 3

24. Промывание носа проводится при:

1. запрокинутой голове
2. наклоненной вбок
3. наклоненной вниз
4. не имеет значения как

Ответ: 3

25. В детской практике целесообразно отказаться от применения препаратов группы:

1. оксиметазолина
2. нафазолина
3. ксилометазолина
4. фенилэфрина

Ответ: 2

26. Противокашлевой препарат центрального действия:

1. преноксдиазин
2. окселадин
3. бутамират
4. сироп солодки

Ответ: 2, 3

27. При кашле с густой, трудно отделяемой мокротой рекомендуются ЛП:

1. противокашлевые
2. муколитические
3. отхаркивающие
4. деконгестанты

Ответ: 2

28. Клинический эффект при приеме отхаркивающих и муколитических ЛС проявляется:

1. через сутки
2. через 2-3 суток
3. через 5-7 суток
4. через 2 недели

Ответ: 3

29. Полоскание горла следует проводить с частотой, не реже, чем:

1. 2 раза в сутки
2. каждые 8 часов

3. каждые 2 часа
4. получас
Ответ: 3
30. Продолжительность времени наложения водно-спиртового компресса на околоушную область:
1. 4 часа
2. 8 часов
3. на ночь
4. на сутки
Ответ: 1
31. Выше факторы риска развития остеоартрита у :
1. молодых
2. пожилых
3. женщин
4. мужчин
Ответ: 2, 3
32. Препарат 1-го выбора для снятия легкой и средней тяжести боли при остеоартрите:
1. метамизол
2. ацетаминофен
3. нимесулид
4. целекоксиб
Ответ: 2
33. Хондронейтральное действие имеет НПВП:
1. мелоксикам
2.ацетилсалициловая кислота
3. пироксикам
4. ибупрофен
Ответ: 1
34. Хондропротективные свойства демонстрируют :
1. румалон
2. хондроитин сульфат
3. глюкозамина сульфат
4.) вольтарен
Ответ: 1, 2, 3
35. Мониторинг безопасности лекарственных средств проводит:
1. Роспотребнадзор
2. Росздравнадзор
3. ФАС
4. Росгвардия
Ответ: 2
36.Полипрагмазией считается одновременный приём :
1. 2-3 ЛП
2. 3-4 ЛП
3. более 5 ЛП
4. более 10ЛП
Ответ: 3
37.Чрезмерно широкое применение хлоргексидина следует ограничить из-за
1. сформировавшейся устойчивости некоторых штаммов бактерий
2. усиления резистентности к антибиотикам
3. роста внутрибольничных инфекций
4. плохого запаха
Ответ: 1, 2, 3
38.Лаксативную болезнь при длительном приеме слабительных вызывают:

1. растительные и минеральные масла
2. пре- и пробиотики
3. магнезии сульфат
4. антрахиноны
Ответ: 4

39.Рекомендации немедикаментозного характера пожилым пациентам с хроническим запором:
1. бегать по утрам
2. увеличить потребление воды
3. пешие прогулки
4. больше овощей и фруктов
Ответ: 2, 3, 4

40. Слабительные средства, противопоказанные беременным и лактирующим:
1. все слабительные
2. раздражающего действия
3. осмотические
4. солевые
Ответ: 2, 4

41. При нейропатической боли провизор может рекомендовать:
1. анальгетики
2. НПВП
3. антибиотики
4. анестетики
Ответ: 4

42. Препараты 1-го ряда при боли в спине в рекомендациях специалиста аптеки:
1. метамизол
2. ацетаминофен
3. ибупрофен
4. толперизон
Ответ: 2. 3

43. Основные эффекты НПВС:
1. жаропонижающий
2. спазмолитический
3. противовоспалительный
4. обезболивающий
Ответ: 1,3, 4

44. ЕАМ рекомендовало использовать нимесулид в случае:
1. дисменореи
2. диареи
3. зубной боли
4. миоартралгии
Ответ: 1, 3

45.Наибольшую гастротоксичность имеют:
1. ацетилсалициловая кислота
2. ацетаминофен
3. индометацин
4. пироксикам
Ответ: 1, 3, 4

46.Причины абузусной головной боли:
1. недостаточное время сна
2. злоупотребление анальгетиками
3. неправильное питание
4. малоподвижность

Ответ: 2

47.Для купирования мигренозной боли следует рекомендовать:

1. аспирин 500мг
2. парацетамол 650 мг
3. любые спазмолитики
4. холод на затылочную область

Ответ: 1, 4

48. Ваши рекомендации клиенту, собирающемуся в поездку со сменой часовых поясов :

1. желчегонные ЛП
2. спазмолитики
3. НПВП
4. мелатонин

Ответ: 4

49. При трудности засыпания женщине в возрасте 45 лет рекомендуются:

1. мелатонин
2. донормил
3. афобазол
4. ново-пассит

Ответ: 4

50.Для купирования боли при подагрическом приступе следует рекомендовать:

1. холод на место боли
2. тепло на место боли
3. положить ногу на возвышение порядка 15 см
4. ибупрофен

Ответ: 1, 3, 4

51.Лекарственные средства, обладающие способностью сокращать продукцию соляной кислоты :

1. всасывающиеся антациды
2. невсасывающиеся антациды
3. ингибиторы протонной помпы
4. Н2-блокаторы

Ответ: 3, 4

52.Лекарственные средства, обладающие способностью нейтрализовать соляную кислоту:

1. всасывающиеся антациды
2. невсасывающиеся антациды
3. ингибиторы протонной помпы
4. Н2-блокаторы

Ответ: 1, 2

53. Альгинат натрия содержится в следующих препаратах от изжоги:

1. ренни
2. маалокс
3. гевискон
4. фамотидин

Ответ: 3

54.Слабительные средства, увеличивающие объём содержимого кишечника:

1. вазелиновое масло
2. отруби
3. морская капуста
4. мукофальк

Ответ: 2, 3, 4

55.Лечение запоров у детей требует приоритета в рекомендациях ЛП:

1. лактулоза

2. макрогол
3. сенны
4. натрия пикосульфат
Ответ: 1, 2
56.Приоритетные группы лекарственных средств, рекомендуемые при метеоризме:
1. анальгетики
2. пеногасители
3. спазмолитики
4. энтеросорбенты
Ответ: 2, 4
57.Пищевые отравления у детей до 2-х лет требуют рекомендации следующих групп ЛП:
1. кишечные антисептики
2. энтеросорбенты
3. регидратанты
4. лоперамид
Ответ: 1, 2, 3
58.Возможные рекомендации при неосложненных инфекциях нижних мочевыводящих путей:
1. употребление большого количества жидкости
2. ибупрофен
3. канефрон
4. ежевичный морс
Ответ: 1, 2, 3
59.Альтернативное предложение при фармацевтическом консультировании пациенток с предменструальным синдромом предполагает включение ЛП:
1. циклодинон
2. КОК
3. магний В6
4. афобазол
Ответ: 1, 3, 4
60. Вагинальные суппозитории, обладающие выраженной эффективностью при вагинальном кандидозе:
1. нистатин
2. гризеофульвин
3. сертаконазол
4. натамицин
Ответ: 3
61. Продолжительность лечения кишечными антисептиками:
1. сутки
2. 3 суток
3. 5-7 суток
4. 7-10 суток
Ответ: 3, 4
62. Кишечные антисептики безрецептурного отпуска:
1. интетрикс
2. эрсефурил
3. фуразолидон
4. лоперамид
Ответ: 2, 3
63. Рекомендации беременным при ДЖВП:
1. соблюдение диеты
2. желчегонные чаи с шиповником, тысячелистником , бессмертником
3. бег по пересечённой местности

4. объём потребляемой жидкости 3 литра
Ответ: 1, 2
64. Препараты, стимулирующие выработку желчи:
1. холеретики
2. холеспазмолитики
3. холекинетики
4. гидрохолеретики
Ответ: 1
65. Антидот лоперамида:
1. метамизол
2. налоксон
3. пиретрум
4. супрадин
Ответ: 2
66.Основной симптом альгодисменореи:
1. потливость
2. боль внизу живота
3. гипертермия
4. суставная боль
Ответ: 2

Критерии оценивания

«Отлично» - более 90% правильных ответов

«Хорошо» - 80-89% правильных ответов

«Удовлетворительно» - 70-79% правильных ответов

«Неудовлетворительно» - менее 70 % правильных ответов

Ситуационные задачи

1. В аптеку обратилась молодая женщина с жалобами на раздражительность, неустойчивость настроения, нагрубание молочных желёз, головную боль, общий дискомфорт, учащение конфликтных ситуаций в семье, на работе. Симптомы начинаются за 4-5 дней до менструации и проходят после ее окончания.
    1. Дайте определение данному симптомокомплексу.
    2. Определите границы Ваших действий при данном симптомокомплексе.
    3. Сформируйте пакет предложений для данного потребителя.
    4. Поясните обоснованность Ваших рекомендаций и режим приёма рекомендуемых средств.
    5. Рекомендации немедикаментозного характера

2. В аптеку обратилась пожилая женщина и попросила продать таблетки Ацетилсалициловой кислоты 250 мг.

Провизор первого стола поинтересовался, с какой целью приобретается данный препарат.

Посетительница ответила, что её 6-летний внук простудился и слёг с повышенной до 38,5 °С температурой.

Родители вызвали врача, а она решила принять меры по снижению жара у внука.

Аспирин считает самым эффективным средством, запомнившимся ей с детства.

Работник аптеки предостерег покупательницу о недопустимости приёма Ацетилсалициловой кислоты детьми и предложил приобрести сироп «Нурофен» для детей.

1. Является ли Ацетилсалициловая кислота жаропонижающим средством? Каков её механизм действия?
2. Какие дополнительные эффекты Ацетилсалициловой кислоты имеют фармакотерапевтическое значение?
3. Какие нежелательные лекарственные реакции характерны для неизбирательных ингибиторов ЦОГ?
4. Почему именно Ацетилсалициловая кислота противопоказана детям?
5. Что показано детям в качестве жаропонижающих средств?

3. Посетитель аптеки попросил продать ему средство от гриппа «ТераФлю».

В ответ на вопрос провизора о самочувствии ответил о повышении температуры тела, катаральных проявлениях, боли в мышцах и суставах в течение 2 суток.

Данное лекарственное средство широко рекламируется по телевидению, как средство быстрого устранения симптомов и возможности не прекращать трудовую деятельность.

Работник аптечной организации отпустил требуемое лекарственное средство, убедил дополнительно приобрести лекарственное средство «Кагоцел», настоятельно рекомендовал вызвать врача и строго соблюдать постельный режим до выздоровления.

1. Каков состав лекарственного средства «ТераФлю» и показания к его применению?
2. Какие нежелательные реакции возможны при приёме данного препарата?
3. Какие ограничения известны для приёма лекарственного средства «ТераФлю»?
4. Какие группы лекарственных средств следует рекомендовать пациентам с сиптоматикой ОРВИ?
5. Правильно ли предложение провизора о выборе именно Кагоцела данному пациента?

4. Содержание оценочных средств промежуточной аттестации

Промежуточная аттестация проводится в виде экзамена.

1. Фармацевтическое консультирование и фармацевтическое информирование.
2. Подходы к фармацевтическому консультированию лиц пожилого возраста.
3. Подходы к фармацевтическому консультированию беременных и лактирующих.
4. Фармацевтическое консультирование при гриппе и ОРВИ
5. Фармацевтическое консультирование при кашле
6. Фармакотерапия при боли. Основные аспекты.
7. Фармацевтическое консультирование при головной боли
8. Фармацевтическое консультирование при заболеваниях опорно-двигательного аппарата: остеоартрит и подагра.
9. Фармацевтическое консультирование при боли в ухе.
10. Фармацевтическое консультирование при хронических заболеваниях вен нижних конечностей.
11. Фармацевтическое консультирование при геморрое.
12. Фармакотерапия инфекций нижних мочевых путей: возможности специалиста аптеки при фармацевтическом консультировании.
13. Фармацевтическое консультирование при климактерических расстройствах
14. Фармацевтическое консультирование при гинекологических заболеваниях
15. Фармацевтическое консультирование по вопросам выбора контрацептивных средств
16. Фармацевтическое консультирование при инсомнии
17. Фармацевтическое консультирование при запорах у пожилых и детей
18. Фармацевтическое консультирование при заболеваниях печени
19. Фармацевтическое консультирование при аллергических заболеваниях

20. Фармацевтическое консультирование при ожирении
21. Фармацевтическое консультирование при реализации витаминов
22. Фармацевтическое консультирование при аллергических заболеваниях
23. Фармацевтическое консультирование при реализации витаминов
24. Фармацевтическое консультирование при синдроме «сухого глаза»
25. Фармацевтическое консультирование при акне
26. Фармацевтическое консультирование при грибковых поражениях кожи и ногтей
27. Фармацевтическое консультирование при повреждениях кожи
28. Фармацевтическое консультирование при токсикоинфекциях
29. Фармацевтическое консультирование при дисбиозе
30. Фармацевтическое консультирование при хроническом панкреатите
31. Фармацевтическое консультирование при метеоризме
32. Фармацевтическое консультирование при изжоге.

5. Критерии оценивания результатов обучения

Оценка **«*отлично*»** выставляется обучающемуся, если он владеет знаниями предмета в полном объеме учебной программы, достаточно глубоко осмысливает дисциплину; самостоятельно, в логической последовательности и исчерпывающе отвечает на все вопросы, подчеркивает при этом самое существенное, умеет анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, конкретизировать и систематизировать изученный материал, выделять в нем главное: устанавливать причинно-следственные связи; четко формирует ответы.

Оценка **«*хорошо*»** выставляется обучающемуся, если он владеет знаниями дисциплины почти в полном объеме программы (имеются пробелы знаний только в некоторых, особенно сложных разделах); самостоятельно и отчасти при наводящих вопросах дает полноценные ответы на вопросы; не всегда выделяет наиболее существенное, не допускает вместе с тем серьезных ошибок в ответах.

Оценка **«*удовлетворительно*»** выставляется обучающемуся, если он владеет основным объемом знаний по дисциплине; проявляет затруднения в самостоятельных ответах, оперирует неточными формулировками; в процессе ответов допускает ошибки по существу вопросов.

Оценка **«*неудовлетворительно*»** выставляется обучающемуся, если он не освоил обязательного минимума знаний предмета, не способен ответить на вопросы даже при дополнительных наводящих вопросах экзаменатора.

Приложение 1

Чек-лист оценки практических навыков

Название практического навыка фармацевтическое консультирование

К	ПК-3.	Способен осуществлять фармацевтическое информирование и консультирование при отпуске и реализации лекарственных препаратов для медицинского применения и других товаров аптечного ассортимента	
Ф	A/04.7	Информирование населения и медицинских работников о лекарственных препаратах и других товарах аптечного ассортимента	
ТД	Оказание информационно-консультационной помощи при выборе безрецептурных лекарственных препаратов и других товаров аптечного ассортимента		
	Действие	Проведено	Не проведено
1.	Поздоровался с пациентом Уточнил необходимость консультации специалиста	1 балл	-1 балл
2.	Уточнил факт обращения к врачу и наличия рецепта Указал на возможность рекомендации только безрецептурных препаратов	1 балл	-1 балла
3.	Расспросил пациента о жалобах и симптомах	1 балл	-1 балл
4.	Перечислил основные показания к применению препарата	1 балл	-1 балл
5.	Уточнил для взрослого или ребёнка приобретается препарат/возраст ребенка Спросил о наличии других заболеваний и приёме препаратов	1 балл	-1 балл
6.	Рекомендовал безрецептурный препарат 1, 2, 3	1 балл	-1 балл
7.	Объяснил механизм действия препарата	1 балл	-1 балла
8.	Рассказал о лекарственных формах, дозировках, особенности взаимодействия с пищей	1 балл	-1 балл
9.	Рассказал о необходимости обратиться к врачу при сохранении симптомов или ухудшении состояния	1 балл	-1 балл
10.	Рассказал о хранении препарата	1 балл	-1 балл
	Итого		

Общая оценка:

«Зачтено» не менее 75% выполнения
«Не зачтено» 74 и менее% выполнения