Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Шуматов Валентин Ярославович
Должность: Ректор
Дата подписания: 06.12.2023 09:54:50
Уникальный программный ключ:
1cef78fd73d75dc6ecf72fe1eb94fe4387e2985d2657b784ecf019df8e794cb4

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Тихоокеанский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации

«УТВЕРЖДАЮ»
Заведующий кафедрой
_____ /Л. В. Устинова/
«20» июня 2023 г.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
Производственной практики
Б2.О.07(П) Практика по фармацевтическому консультированию и информированию
основной образовательной программы высшего образования

Направление подготовки (специальность)	33.05.01 Фармация (код, наименование)
Уровень подготовки	специалитет (специалитет/магистратура)
Направленность подготовки	02 Здравоохранение
Сфера профессиональной деятельности	в сфере обращения лекарственных средств и других товаров аптечного ассортимента
Форма обучения	очная (очная, очно-заочная)
Срок освоения ООП	5 лет (нормативный срок обучения)
Институт/кафедра	фармации

Владивосток – 2023

1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

1.1. Фонд оценочных средств регламентирует формы, содержание, виды оценочных средств для текущего контроля, промежуточной аттестации и итоговой (государственной итоговой) аттестации, критерии оценивания дифференцированно по каждому виду оценочных средств.

1.2. Фонд оценочных средств определяет уровень формирования у обучающихся установленных в ФГОС ВО и определенных в основной образовательной программе высшего образования по специальности 33.05.01 Фармация, направленности 02 Здравоохранение в сфере обращения лекарственных средств и других товаров аптечного ассортимента универсальных (УК) компетенций, общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных (ПК) компетенций

https://tgmu.ru/sveden/education/programs/farmaciya-v-sfere-obrascheniya-lekarstvennyh-sredstv-i-drugih-tovarov-aptechnogo-assortimenta_op0120.html

2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

2.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств

№ п/п	Виды контроля	Оценочные средства
		Форма
1	**Текущий контроль**	**Тесты**
2	**Промежуточная аттестация**	**Тесты**
		Чек-лист практического навыка
		Вопросы для собеседования

3. Содержание оценочных средств текущего контроля

Текущий контроль осуществляется преподавателем производственной практики в форме: тестирования,

1.Какой энтеросорбент обладает самой мощной поглотительной способностью:
смекта;
энтеросгель
полифепан
*полисорб

2. При лихорадке на фоне вирусной инфекции у детей противопоказан
парацетамол
*ацетилсалициловая кислота
ибупрофен
нимесулид

3. Активный метаболит бромгексина:
ацетилцистеин

карбоцистеин
хлоропирамин
*амброксол

4. Противокашлевое средство периферического действия:
амброксол
ацетилцистеин
*преноксдиазин
кодеин

5. Какое слабительное ЛС можно рекомендовать пациенту с геморроем:
кора крушины
*дюфалак
сенаде
микролакс

6. Антацид, образующий в желудке гелеобразный плот из альгината натрия:
ренни
альмагель
маалокс
*гевискон

7. Слабительные средства, назначаемые для очищения кишечника перед операцией:
нормазе
мукофальк
гутталакс
*фортранс

8. Укажите препарат, вызывающий при длительном применении лаксативную болезнь
нормазе
мукофальк
гутталакс
*сенаде

9. Из ниже приведённых лекарственных средств выберите гомеопатический ЛП:
фосфоглив
гептрал
лив-52
*галстена

10. Оральную регидратацию проводят лекарственным препаратом:
энтеросгель;
*регидрон;
лоперамид
энтеродез

11. Какой препарат ингибирует желудочно-кишечные липазы?
колестирамин
аторвастатин
никотиновая кислота
*орлистат

12. Клавулановая кислота
*предотвращает разрушение амоксициллина бета-лактамазами

предотвращает разрушение амоксициллина почечной дегидропептидазой
улучшает всасывание амоксициллина в пищеварительном тракте
нарушает биосинтез бактериального белка на рибосомах

13. Для профилактики и лечения вируса гриппа применяют
*осельтамивир
саквинавир
телбивудин
ацикловир

14. Какое средство относится к противорвотным?
*метоклопрамид
лоперамид
натрия пикосульфат
дротаверин

15. Препаратом, разрешенным к применению при беременности и лактации, является:
*гексикон
тинидазол
метронидазол
орнидазол

16. Кетоконазол в вагинальных суппозиториях выпускается под торговым наименованием:
бетадин
пимафуцин
*ливарол
канизон

17. При неосложненном вульвовагинальном кандидозе в дозировке 150 мг перорально однократно применяется:
интраконазол
миканозол
сертаконазол
*флуканозол

18. Находится на предметно-количественном учете:
фет-х
*субутрамин
орлистат
магния сульфат

19. Деконгестант короткого действия:
ксилометазолин
оксиметазолин
*нафазолин
цефазолин

20. Продолжительность использования деконгестантов:
1-2 дня
*5-7 дней
1-2 недели
без ограничений

21. Долгосрочный побочный эффект ксилометазолина
кандидоз ротовой полости
нарушения функции печени
угнетение кроветворения
*атрофия слизистой оболочки

22. Побочным эффектом орлистата является
почернение стула
проаритмогенное действие
*стеаторея
фотодерматозы

23. Какое снотворное средство является синтетическим аналогом гормона эпифиза?
золпидем
*мелатонин
мидазолам
доксиламин

24. Какой препарат относится к группе общетонизирующих средств?
экстракт сенны
алкалоиды барвинка малого
*экстракт элеутерококка
экстракт валерианы

25. Для экстренной контрацепции применяют
*левоноргестрел
этинилэстрадиол
тамоксифен
окситоцин

26. В течение скольких часов наиболее эффективна экстренная гестагенная контрацепция?
*24-48
72
96
120

27. При мигрени применяют:
мексидол
метопролол
*суматриптан
пентоксифиллин

28. Для восполнения дефицита витамина В6 применяют:
рибофлавин
*пиридоксин
аскорбиновую кислоту
фолиевую кислоту

29. Продолжительность действия дезлоратадина составляет:
12 ч
6 ч
*24 ч
48 ч

30. К желчегонным средствам относится
лоперамид
эссенциальные фосфолипиды
*гимекромон
адеметионин

31. К солевым слабительным относится:
*магния сульфат
натрия пикосульфат
сеннозиды А и В
метоклопрамид

32. Механизм действия омепразола:
блокирует М1-холинорецепторы
*ингибирует протонную помпу
стимулирует простагландиновые рецепторы
блокирует гистаминовые Н2-рецепторы

33. При бронхиальной астме противопоказаны или применяются с осторожностью:
*β-адреноблокаторы
глюкокортикостероиды
М-холиноблокаторы
β-адреномиметики

34. Сульфаниламид, применяемый местно в виде глазных капель
*сульфацетамид
ко-тримоксазол
фталилсульфатиазол
норфлоксацин

35. Противогрибковое средство в форме лака для ногтей
*аморолфин
кетоконазол
флуконазол
амфотерицин В

36. Растительное средство, обладающее желчегонными свойствами:
плоды малины
трава фиалки
*цветки бессмертника
трава термопсиса

37. Побочный эффект в виде сухого кашля отмечается при приеме внутрь:
альфа-адреноблокаторов
антогонистов кальция
*ингибиторов АПФ
глюкокортикоидов

38. Предпочтительная лекарственная форма деконгестанта для детей до 1 года
спрей
гель
*капли
таблетки

39. Обострение язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки является возможным побочным эффектом группы ЛС:

*НВПС
ноотропы
желчегонные
ингибиторы АПФ

40. Противовоспалительный препарат нестероидной структуры /НПВС/

*диклофенак
диазолин
карбамазепин
преднизолон

4. Содержание оценочных средств промежуточной аттестации

Промежуточная аттестация проводится в виде зачета с оценкой: тестирования, оценки практических навыков и собеседования.

Вопросы для собеседования

1. Фармацевтическое консультирование и фармацевтическое информирование.
2. Подходы к фармацевтическому консультированию лиц пожилого возраста.
3. Подходы к фармацевтическому консультированию беременных и лактирующих.
4. Фармацевтическое консультирование при гриппе и ОРВИ
5. Фармацевтическое консультирование при кашле и боли в горле
6. Фармакотерапия при боли. Основные аспекты.
7. Фармацевтическое консультирование при головной боли, боли в нижней части спины.
8. Фармацевтическое консультирование при заболеваниях опорно-двигательного аппарата: остеоартрит и подагра.
9. Фармацевтическое консультирование при боли в ухе.
10. Фармацевтическое консультирование при хронических заболеваниях вен.
11. Хроническая венозная недостаточность и геморрой.
12. Фармацевтическое консультирование при гинекологических заболеваниях
13. Фармацевтическое консультирование при стоматологических заболеваниях
14. Фармакотерапия инфекций нижних мочевых путей: возможности специалиста аптеки при фармацевтическом консультировании.
15. Фармацевтическое консультирование при климактерических расстройствах
16. Фармацевтическое консультирование по вопросам выбора контрацептивных средств
17. Фармацевтическое консультирование при инсомнии
18. Фармацевтическое консультирование при запорах у пожилых и детей
19. Фармацевтическое консультирование при заболеваниях печени
20. Фармацевтическое консультирование при аллергических заболеваниях
21. Фармацевтическое консультирование при ожирении
22. Фармацевтическое консультирование при реализации витаминов
23. Основы ответственного самолечения

Тесты

К желчегонным средствам относится
эссенциальные фосфолипиды

лоперамид
адеметионин
*гимекромон

К антацидным средствам относится
*алюминия гидроксид + магния гидроксид
смектит диоктаэдрический
уголь активированный
пирензепин

К солевым слабительным относится
натрия пикосульфат
*магния сульфат
сеннозиды а и в
метоклопрамид

Механизм действия рабепразола состоит в
блокировании м1-холинорецепторов
*ингибировании протонной помпы
стимулировании простагландиновых рецепторов
блокировании гистаминовых н2-рецепторов

Механизм действия эзомепразола состоит в
блокировании м1-холинорецепторов
*ингибировании протонной помпы
стимулировании простагландиновых рецепторов
блокировании гистаминовых н2-рецепторов

Механизм действия ранитидина состоит в
*блокировании гистаминовых н2-рецепторов
блокировании м1-холинорецепторов
стимулировании простагландиновых рецепторов
ингибировании протонной помпы

К блокаторам н2-гистаминовых рецепторов относится
*ранитидин
омепразол
флуконазол
сульфагуанидин

К ингибиторам протонной помпы относится
*омепразол
фамотидин
флуконазол
сульфагуанидин

Антисекреторный эффект, обусловленный блокадой Н2-гистаминовых рецепторов, характерен для
*фамотидина
омепразола
флуконазола
пирензепина

Антисекреторный эффект, обусловленный блокадой m-холинорецепторов, наблюдается при применении
*пирензепина
омепразола
ранитидина
фамотидина

Структурным аналогом простагландинов является
висмута субцитрат коллоидный
сукралфат
омепразол
*мизопростол

При диспептических нарушениях на фоне замедленного опорожнения желудка применяют
*домперидон
ондансетрон
дротаверин
лоперамид

Противорвотным средством, блокирующим центральные серотониновые рецепторы, является
домперидон
метоклопрамид
*ондансетрон
дифенгидрамин

Противорвотным средством, блокирующим дофаминовые рецепторы, является
*метоклопрамид
ондансетрон
скополамин
дифенгидрамин

Анорексигенным эффектом обладает
*флуоксетин
пирацетам
настойка полыни
инсулин

Стимулирующим действием на тонус миометрия обладает
*эргометрин
омепразол
сальбутамол
гексопреналин

При бронхиальной астме противопоказаны или применяются с осторожностью
глюкокортикостероиды
*β-адреноблокаторы
м-холиноблокаторы
β -адреномиметики

При непродуктивном сухом кашле применяют
бромгексин
ацетилцистеин
амброксол

*бутамират

Галогенсодержащим антисептиком является
*хлоргексидин
пероксид водорода
тетрациклин
энфувиртид

5. Критерии оценивания результатов обучения

«Отлично» – пороговый или высокий уровень сформированности профессиональных компетенций в период практики, высокий уровень знаний, высокая степень выполнения практических навыков, активный подход к решению профессиональных задач разной степени сложности, предусмотренных программой практики и профессиональным стандартом и/или квалификационными характеристиками.

«Хорошо» – пороговый или высокий уровень сформированности компетенций, в период практики, адекватный уровень знаний, адекватная степень выполнения практических навыков, адекватная способность к решению стандартных профессиональных задач, предусмотренных программой практики в соответствии с профессиональным стандартом и/или квалификационными характеристиками.

«Удовлетворительно» – пороговый уровень сформированности компетенций в период практики, уровня знаний и степени выполнения практических навыков достаточно для решения типовых профессиональных задач, предусмотренных программой практики в соответствии с профессиональным стандартом и/или квалификационными характеристиками.

«Неудовлетворительно» – пороговый или ниже уровень сформированности компетенций в период практики, уровня знаний и степени выполнения практических навыков недостаточно для решения типовых профессиональных задач, предусмотренных программой практики в соответствии профессиональным стандартом и/или квалификационными характеристиками.

Приложение 1

Чек-лист оценки практических навыков

Название практического навыка фармацевтическое консультирование

К	ПК-3.	Способен осуществлять фармацевтическое информирование и консультирование при отпуске и реализации лекарственных препаратов для медицинского применения и других товаров аптечного ассортимента		
Ф	A/04.7	Информирование населения и медицинских работников о лекарственных препаратах и других товарах аптечного ассортимента		
ТД	Оказание информационно-консультационной помощи при выборе безрецептурных лекарственных препаратов и других товаров аптечного ассортимента			
	Действие		Проведено	Не проведено
1.	Поздоровался с пациентом Уточнил необходимость консультации специалиста		1 балл	-1 балл
2.	Уточнил факт обращения к врачу и наличия рецепта Указал на возможность рекомендации только безрецептурных препаратов		1 балл	-1 балла
3.	Расспросил пациента о жалобах и симптомах		1 балл	-1 балл
4.	Перечислил основные показания к применению препарата		1 балл	-1 балл
5.	Уточнил для взрослого или ребёнка приобретается препарат/возраст ребенка Спросил о наличии других заболеваний и приёме препаратов		1 балл	-1 балл
6.	Рекомендовал безрецептурный препарат 1, 2, 3		1 балл	-1 балл
7.	Объяснил механизм действия препарата		1 балл	-1 балла
8.	Рассказал о лекарственных формах, дозировках, особенности взаимодействия с пищей		1 балл	-1 балл
9.	Рассказал о необходимости обратиться к врачу при сохранении симптомов или ухудшении состояния		1 балл	-1 балл
10.	Рассказал о хранении препарата		1 балл	-1 балл
	Итого			

Общая оценка:

«Зачтено» не менее 75% выполнения
«Не зачтено» 74 и менее% выполнения